

Quick 50 EC

Herbicīds

Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīglapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, cukurbiešu, lopbarības biešu, galda biešu, topinambūra, saulespuķu, sojas, burkānu, seleriju (sakņu), mārrutku, pastinaku, pētersīlu (sakņu), redīsu, kāļu, rāceņu, sīpolu, šalotes sīpolu, ķiploku, salātu, endīviju, rukolas, brūno sinepju, dārza pupiņu, zirņu (graudiem), lauka pupu (graudiem), lēcu, aunaziņu (graudiem), lupīnas (graudiem) sējumos un stādījumos, vīnogu, ābeļu, bumbieru, cidoniju un parastā mespila stādījumos.

Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Reģistrācijas Nr.: 0429

Reģistrācijas klase: 2.

Iepakojums: 4 x 5 l

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma



BĪSTAMI

H304	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpcēļos
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus
H335	Var izraisīt elpcēļu kairinājumu
H336	Var izraisīt miegainību vai reiboņus
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
EUH066	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu
EUH401	Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību
P261	Izvairīties ieelpot smidzinājumu, izgarojumus
P280	Izmantot aizsargcimdus, acu aizsargs, sejas aizsargs
P301+P310	NORĀŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu
P305+P351+P338	SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu
P310	NEIZRAISĪT vemšanu
P331	Savākt izšķakstīto šķidrumu
P391	Atbrīvoties no saturā/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības
SP1	Nepiesārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecu tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
Spe3	Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Spe3 Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 75% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

Avārijas gadījuma ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese:

Sharda Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek
Belgium

Ražotājs, tā adrese:

Sharda Cropchem Ltd.
Dominic Holm, 29th Road
Bandra (West)
Mumbai 400050
Indija

Preparāta izplatītājs Latvijā:

Augu Audzēšanas Serviss SIA
Lielvārdes iela 41
Rīga LV-1006
Latvija
Tel. + 371 67541995

Uzglabāšanas nosacījumi: Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepielāaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā no ražošanas datuma.

Quick 50 EC

Herbicīds

Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīglapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, cukurbiešu, lopbarības biešu, galda biešu, topinambūra, saulespuķu, sojas, burkānu, seleriju (sakņu), mārrutku, pastinaku, pētersīlu (sakņu), redīsu, kāļu, rāceņu, sīpolu, šalotes sīpolu, kiploku, salātu, endīviju, rukolas, brūno sinepju, dārza pupiņu, zirņu (graudiem), lauka pupu (graudiem), lēcu, aunaziņu (graudiem), lupīnas (graudiem) sējumos un stādījumos, vīnogu, ābeļu, bumbieru, cidoniju un parastā mespila stādījumos.

Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Reģistrācijas Nr.: 0429

Reģistrācijas klase: 2.

Iepakojums: 5 l

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma



BĪSTAMI

H304	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos
H318	Izraisa nopietrus acu bojājumus
H335	Var izraisīt elpceļu kairinājumu
H336	Var izraisīt miegainību vai reiboņus
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
EUH066	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu
EUH401	Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojet lietošanas pamācību
P261	Izvairīties ieelpot smidzinājumu, izgarojumus
P280	Izmantot aizsargcimdus, acu aizsargus, sejas aizsargas
P301+P310	NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu
P305+P351+P338	SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu
P310	NEIZRAISĪT vemšanu
P331	Savākt izšķakstīto šķidrumu
P391	Atbrīvoties no saturā/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības
SP1	Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
Spe3	Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Spe3	Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 75% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas..
------	---

Avārijas gadījuma ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese:

Sharda Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek
Belgium

Ražotājs, tā adrese:

Sharda Cropchem Ltd.
Dominic Holm, 29th Road
Bandra (West)
Mumbai 400050
Indija

Preparāta izplatītājs Latvijā:

SIA „Augu Audzēšanas Serviss”
Lielvārdes iela 41
Rīga LV-1006
Latvija
Tel. + 371 67541995

Uzglabāšanas nosacījumi: Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā no ražošanas datuma.

Pirmā palīdzība

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Norādījumi ārstam

Simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs 67042473

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem.

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

Nedzert, neēst un nesmēkēt darbojoties ar vielu.

Novērst tiešu kontaktu ar produktu. Strādājot ar preparātu vai pieskaroties piesārņotām virsmām, jālieto aizsargapģērbs un slēgti gumijas apavi. Jālieto ķīmiski izturīgi: nitrila gumijas (≥ 0.4 mm) cimdi. Jālieto aizsargbrilles, respirators. Pēc darba vai pirms pārtraukuma novilkta darba apģērbu un nomazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm. Aizsargapģērbu uzglabāt atsevišķi. Piesārņotu aizsargapģērbu nekavējoties novilkta un izmazgāt. Ja aizsargapģērbu nav iespējams izmazgāt, tas jāiznīcina saskaņā ar likumdošanas normu prasībām.

Darba laikā neēst, nedzert, nesmēkēt.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Quick 50 EC ir herbicīds, kas efektīvi iedarbojas uz īsmūža un daudzgadīgajām viendīgļlapju nezālēm to kontrolei sējumos pēc kultūraugu sadīgšanas.

Quick 50 EC ir emulsijas koncentrāta formā, satur darbīgo vielu etil-kvizalofops-P 50 g/l.

Etil-P-kvizalofops pieder fenoksipropionskābes grupai. Darbīgā viela augos iekļūst caur lapām un pārvietojas pa augu, uzkrājas augu aktīvās augšanas punktos saknēs un stublājā.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Quick 50 EC lietot kultūraugu sējumos un stādījumos, kad īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles ir aktīvi augošas. Nezāļu lapu virsmai apsmidzināšanas laikā jābūt sausai, bet augsnēi jābūt mitrai, lai sekmētu herbicīda pārvietošanos augos. Nezāles, kas izdīgs pēc sējumu un stādījumu apstrādes, netiks kontrolētas.

Lietošanas laiks un devas

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	5	6	7
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Labības - sārņaugi	0.75-1.25	Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar kultūrauga pirmā lapu pāra attīstību līdz sāndzinumu veidošanās sākumam (AS 11-21), labību- sārņaugu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	-	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0-1.5	Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar kultūrauga pirmā lapu pāra attīstību līdz sāndzinumu veidošanās sākumam (AS 11-21), sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)		
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles, ložņu vārpata (<i>Elytrigia repens</i>)	2.0-3.0	Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar kultūrauga pirmā lapu pāra attīstību līdz sāndzinumu veidošanās sākumam (AS 11-21), sākot ar nezāļu 4-6 lapu stadiju.		

1	2	3	5	6	7
Cukurbietes*, lopbarības bietes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju nezāles	1.0-3.0	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga vienu lapu pāri līdz trīs lapu pāriem (AS 11-13)	-	1
Galda bietes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju nezāles	1.0-2.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga vienu lapu līdz lapas sedz 30% no augsnēs virskārtas (AS 11-33)	-	1
Topinambūrs*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju nezāles	1.0-2.0	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga dīglapu stadiju līdz izveidojušies deviņi stublāja posmi (AS 10-39)	-	1
Saulespuķes*	Īsmūža viendīglapju nezāles	1.0-1.25	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga dīglapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 10-16)	-	1
Soja*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju nezāles	1.0-2.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu pāri līdz sāndzinumu attīstības sākumam (AS 12-21)	-	1
Burkāni*, selerijas* (sakņu), mārrutki*, pastinaki*, pētersīli* (sakņu), redīsi*, kāļi*, rāceņi*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju nezāles	1.0-2.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz saknes veidošanās sākumam (AS 11-41)	40	1
Sīpoli*, šalotes sīpoli*, kīploki*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju nezāles	1.0-2.0	Apsmidzināt sējumus vai stādījumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz izveidojušas deviņas lapas (AS 11-19)	42	1
Salāti*, endīvija*, rukola*, brūnās sinepes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju nezāles	1.0-3.0	Apsmidzināt sējumus vai stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojies 30% no šķirnei raksturīgā lapu rozetes lieluma (AS 12-33)	28	
Dārza pupīņas*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju nezāles	1.0-2.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu pāri līdz sāndzinumu veidošanās sākumam (AS 12-21)	45	1
Zirņi* (graudiem)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju nezāles	1.0-2.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušies deviņi stublāja posmi (AS 12-39)	42	1
Lauka pupas* (graudiem), lēcas*, aunazirņi* (graudiem)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju nezāles	1.0-2.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušies deviņi stublāja posmi (AS 12-39)	49	1
Lupīna* (graudiem)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju nezāles	1.0-2.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu pāri līdz izveidojušies deviņi un vairāk sāndzinumu (AS 12-29)	49	1

Vīnogas*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju nezāles	1.0-3.0	Apsmidzināt stādījumu, sākot ar kultūrauga ogu attīstības fāzes beigām līdz ogu nogatavošanās fāzes vidum (AS 79-85)	35	1
Ābeles*, bumbieres*, cidonijas*, parastais mespils*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju nezāles	1.0-3.0	Apsmidzināt stādījumu, sākot ar kultūrauga augļa briešanas stadiju līdz augļu nogatavošanās sākuma stadijai (AS 75-81)	35	1

***Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Piezīmes.

Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot **5 m** aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 75% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

Jāievēro intervāls starp apstrādi ar Quick 50 EC un citu herbicīdu lietošanu: rapša sējumos - 14 dienas.

Darba šķidruma patēriņš: 200-400 l/ha. Lietot augstāko darba šķidruma apjomu biezākos sējumos, kā arī sējumos, kur izplatīta vējauza.

Ieteicamā izsmidzināšana: vidēja lieluma pilieni.

Saderība ar citiem preparātiem (tvertnes maisījumu veidošana)

Par iespēju Quick 50 EC lietot tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem un mēslošanas līdzekļiem iegūt informāciju ražotāja mājas lapā vai zvanīt ražotāja pārstāvim.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šķūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā.

Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Quick 50 EC daudzumu tieši tvertnē. Tukšo preparāta kannu izskalo ar ūdeni 3 reizes, skalojamo ūdeni pievieno tvertnē esošajam darba šķidrumam. Pievieno atlikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TĪRĪŠANA

Smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas, pilnībā iztukšojiet smidzinātāja tvertni un izmazgājet ar tīru ūdeni. Izskalojiet konteineru, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šķūtenēm.
- Piepildiet konteineru līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet (sakratiet) un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šķūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstājiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni cauri maisītāju un šķūtenēm pilnībā iztukšojot konteineru.

- Noņemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzeklī, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem.

REZISTENCES VEIDOŠANĀS IEROBEŽOŠANAS STRATĒGIJA

Dažas viengadīgās viendīglapju nezāles, piemēram, vējauza var attīstīt rezistenci pret herbicīdiem, kā rezultātā var būt zema nezāļu kontroles efektivitāte. Quick 50 EC satur darbīgo vielu etil-kvizalofops-P, kuras iedarbības mehānisms ir augu acetilCoA karboksilāzes (ACCase) inhibīšana. Etil-kvizalofops-P saskaņā ar HRAC klasifikāciju pieder grupai A. Rezistences veidošanās risku palielina cita ACCase inhibitoru saturoša augu aizsardzības līdzekļa lietošana to pašu nezāļu ierobežošanai kultūrauga veģetācijas periodā. Ir pieļaujams lietot citu ACCase inhibitoru saturošu herbicīdu, ja tas tiek lietots citā laikā un citu nezāļu ierobežošanai. Lai samazinātu rezistences veidošanās risku, nelietot Quick 50 EC vai citu preparātu, kurš satur ACCase inhibitoru, kā vienīgo kīmisko metodi viendīglapju nezāļu ierobežošanai augsekā.

ATKĀRTOTA SĒJA UN PĒCKULTŪRAS

Quick 50 EC var izraisīt bojājumus pēcaugiem.

Jāievēro 18 nedēļu intervāls starp apstrādi ar Quick 50 EC un graudaugu vai zālaugu sēju. Kā pēckultūru nevar sēt kukurūzu, sīpolus, stādīt puravus.

Jābūt vismaz 14 dienu intervālam starp Quick 50 EC (deva līdz 1.25 l/ha) vai 42 dienu intervālam starp Quick 50 EC (deva līdz 3 l/ha) izmantošanu un graudaugu sēšanu.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Pēc iztukšošanas iepakojumu trīs reizes izskalot ar tīru ūdeni un skalojamo šķidrumu izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBA

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Noplūdes gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā nezemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē savu preparātu kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparātu piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs.